

Defendyl®

Imunoglukan^{P4H} D₃

Navodilo za uporabo
Defendyl-Imunoglukan P4H® D₃ žvečljive tablete

Prehransko dopolnilo s sladili

Za odpornost¹ • IMG® (pleuran, izoliran iz gobe bukov ostrigar) • cink¹ • vitamin D₃

1 tableta vsebuje:

50 mg IMG® (pleuran, izoliran iz gobe bukov ostrigar) (PDV* ni določen), 5 mg cink (50 % PDV*) in 10 µg vitamin D₃ [200 % PDV*]; * PDV – priporočeni dnevni vnos.

Sestavine:

sladilo [D-manitol], sredstvo za povečanje prostornine [D-sorbitol], IMG® (pleuran, izoliran iz gobe bukov ostrigar), cinkov citrat (cink), sredstvo proti sprijemanju (stearinska kislina in silicijev dioksid), aroma maline, holekalciferol (vitamin D₃), sladilo (sukraloza).

Uporaba:

Defendyl-Imunoglukan P4H® D₃ žvečljive tablete so prehransko dopolnilo za dolgotrajno uporabo. Vsebujejo IMG® (pleuran, izoliran iz gobe bukov ostrigar), cink in vitamin D₃. Sestavine delujejo sinergistično in tako pripomorejo k boljšemu delovanju imunskega sistema. IMG® je visoko prečiščen kompleks iz naravnih biološko aktivnih polisaharidov. Vitamin D je potreben za normalno rast in razvoj kosti otrok ter prispeva k ohranjanju zdravih kosti.

Priporočeno odmerjanje:

Defendyl-Imunoglukan P4H® D₃ žvečljive tablete so primerne za otroke, starejše od 3 let, in odrasle. Otroci do 25 kg telesne mase naj jemljejo 1 tableto na dan, otroci, težji od 25 kg, pa 2 tableti na dan. Tablete zaužijte med obroki tako, da jih počasi žvečite oz. raztopite v ustih. Lahko jih jemljete daljše obdobje.

Opombe:

Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano. Pomembna sta raznolika in uravnotežena prehrana ter zdrav način življenja. Prekomerno uživanje ima lahko odvajalni učinek.

Opozorila:

Defendyl-Imunoglukan P4H® D₃ žvečljivih tablet ne smejo jemati bolniki s presajenimi organi. Bolniki, ki prejemajo imunosupresivno zdravljenje, ter nosečnice in doječe matere lahko jemljejo Defendyl-Imunoglukan P4H® D₃ žvečljive tablete le po posvetu z zdravnikom.

Shranjevanje:

Shranjujte nedosegljivo otrokom! Shranjujte v suhem prostoru pri temperaturi od 15 °C do 25 °C, zaščiteno pred vlago in pred neposredno sončno svetlobo.

Pakiranje:

vsebnik s 30 žvečljivimi tabletami



¹ Cink in vitamin D prispevata k delovanju imunskega sistema.

Defendyl®

Imunoglukan P4H®

Na voljo
tudi kot

Defendyl-Imunoglukan P4H®
FORTE Junior

Prehransko dopolnilo v tekoči obliki, ki vsebuje polisaharid IMG® (pleuran, izoliran iz gobe bukov ostrigar), vitamin C in cink. Vsebuje tudi izvlečke rastlin (južnoafriška pelargonija, črni bezeg, črni ribez in okroglostna rosika) s pozitivnim vplivom na imunski sistem¹ in dihala².

Defendyl-Imunoglukan P4H® FORTE Junior je namenjen otrokom od 3. leta starosti. Otroci do 25 kg telesne mase naj jemljejo 5 ml tekočine dvakrat na dan ali 10 ml enkrat na dan. Otroci, težji od 25 kg, naj jemljejo 10 ml tekočine dvakrat na dan ali 20 ml enkrat na dan. Izdelek se jemlje na prazen želodec med glavnimi obroki, vsaj 5 zaporednih dni.

Ne vsebuje glutena in mlečnih beljakovin.



Defendyl-Imunoglukan P4H® D₃
kapsule

Prehransko dopolnilo vsebuje polisaharid IMG® (pleuran, izoliran iz gobe bukov ostrigar), cink, vitamin C in vitamin D₃. Sestavine delujejo sinergistično in tako pripomorejo k boljšemu delovanju imunskega sistema ter zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.

Defendyl-Imunoglukan P4H® D₃ kapsule so primerne za otroke, starejše od 6 let, in odrasle. Jemljite 1 kapsulo na dan daljše obdobje, vsaj 2 do 3 mesece. Pri povečanih potrebah jemljite 2 kapsuli 5 dni. Defendyl-Imunoglukan P4H® D₃ kapsule lahko neprekinjeno jemljete 6 mesecev.

Defendyl-Imunoglukan P4H® D₃ kapsule so primerne za diabetike, vegetarijance in osebe z alergijami.

Ne vsebujejo glutena in laktoze.
Ovojnica kapsul je rastlinskega izvora.



¹ Vitamin C, cink in črni ribez imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.

² Južnoafriška pelargonija, črni bezeg in okroglostna rosika podpirajo zdravje dihal.

Opozorila: Defendyl-Imunoglukan P4H® ne smejo jemati bolniki s presajenimi organi. Bolniki, ki prejemajo imunosupresivno zdravljenje, ter nosečnice in doječe matere, lahko jemljejo Defendyl-Imunoglukan P4H® le po posvetu z zdravnikom. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano. Pomembna sta raznolikost in uravnotežena prehrana ter zdrav način življenja.