

SI

Defendyl®

Imunoglukan P4H®



Navodilo za uporabo
Defendyl-Imunoglukan P4H® junior

Prehransko dopolnilo v tekoči obliki, ki vsebuje naravni IMG® in vitamin C. Vitamin C ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.

Sestavine:

voda, fruktoza, IMG® (beta-(1,3/1,6)-D-glukan), vitamin C, (L-askorbinska kislina), sredstvo za uravnavanje kislosti (citronska kislina), konzervans (kalijev sorbat)
Energijska vrednost v 1 ml: 0,3 kcal/1,3 kJ

Lastnosti:

Defendyl-Imunoglukan P4H® junior

vsebuje naravni polisaharid IMG® (beta-(1,3/1,6)-D-glukan), izoliran iz gobe bukov ostrigar (*Pleurotus ostreatus*) in vitamin C. Vitamin C ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.

Defendyl-Imunoglukan P4H® junior je primeren tudi za diabetike in vegetarijance.

Defendyl-Imunoglukan P4H® junior ne vsebuje glutena in laktoze.

Defendyl-Imunoglukan P4H® junior je namenjen otrokom in odraslim, ki jim bolj ustreza prehransko dopolnilo v tekoči obliki.

Priporočeni dnevni odmerek in način uporabe:

Telesna masa (kg)	Priporočena količina (ml)	IMG® (beta-(1,3/1,6)-D-glukan) (mg)	Vitamin C (mg)
Otroci	15	3	30 (38 % PDV/RDA)
	20	4	40 (50 % PDV/RDA)
	25	5	50 (63 % PDV/RDA)
	30	6	60 (75 % PDV/RDA)
Odrasli	70	14	140 (175 % PDV/RDA)

PDV/RDA (priporočeni dnevni vnos)

Opozorila: Defendyl-Imunoglukan P4H® junior ne smejo jemati bolniki s presajenimi organi. Bolniki, ki prejemajo imunosupresivno zdravljenje, lahko jemljejo Defendyl-Imunoglukan P4H® junior le po posvetu z zdravnikom. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano. Pomembna sta raznolikost in uravnotežena prehrana ter zdrav način življenja.

Za podporo delovanju imunskega sistema jemljite po 1 ml tekočine/5 kg telesne mase, enkrat na dan, 2 do 3 mesece. Pri povečanih potrebah jemljite prvih pet dni dvojni odmerek.

Defendyl-Imunoglukan P4H® junior lahko jemljete neprekinjeno tudi 6 mesecev. Tekočino vzemite na prazen želodec zjutraj pol ure pred zajtrkom ali zvečer pred spanjem. Pred uporabo stekleničko dobro pretresite.

Shranjevanje:

Shranjujte nedosegljivo otrokom! Shranjujte pri temperaturi od 5 do 25 °C, zaščiteno pred vlago in neposredno sončno svetlobo. Po prvem odprtju hranite izdelek v hladilniku pri temperaturi od 2 do 8 °C in ga porabite v treh mesecih. V tekočini se lahko pojavijo beli kristali, kar pa ne vpliva na kakovost izdelka.

Pakiranje:

Steklenička, 120 ml ali 250 ml

HR

Defendyl®

Imunoglukan P4H®



Uputa za upotrebu
Defendyl-Imunoglukan P4H® junior

Tekući dodatak prehrani koji sadrži prirodni IMG® i vitamin C. Vitamin C doprinosi normalnoj funkciji imunološkog sustava.

Sastojci:

voda, fruktoza, IMG® (beta-(1,3/1,6)-D-glukan, vitamin C, (L-askorbatna kiselina), regulator kiselosti: limunska kiselina, konzervansi: kalijev sorbat Energetska vrijednost u 1 ml: 0,3 kcal/1,3 kJ

Defendyl-Imunoglukan P4H® junior

sadrži prirodni polisaharid IMG® (beta-(1,3/1,6)-D-glukan), izoliran iz gljive bukovače (*Pleurotus ostreatus*) i vitamin C, koji doprinosi normalnoj funkciji imunološkog sustava.

Defendyl-Imunoglukan P4H® junior je primjeren za dijabetičare i vegetarijance.

Defendyl-Imunoglukan P4H® junior ne sadrži gluten i laktozu.

Defendyl-Imunoglukan P4H® junior je namijenjen za djecu i odrasle kojima više odgovara dodatak prehrani u tekućem obliku.

Kao pomoć funkciji imunološkog sustava, uzimajte 1 ml tekućine/5 kg tjelesne mase jedanput na dan, kroz 2 do 3 mjeseca. Kod povećanih potreba preporučuje se uzimanje dvostruke doze u prvih pet dana.

Defendyl-Imunoglukan P4H® junior

možete uzimati neprekidno kroz 6 mjeseci. Tekućinu je potrebno uzimati na prazan želudac ujutro ili navečer prije spavanja. Prije upotrebe bočicu je potrebno dobro protresti.

Čuvanje:

Čuvati od dohvata male djece!
Čuvati pri temperaturi od 5 do 25 °C, zaštićeno od vlage i direktne sunčeve svjetlosti. Nakon prvog otvaranja čuvati proizvod u hladnjaku pri temperaturi od 2 do 8 °C te ga upotrijebiti u roku od tri mjeseca. U tekućini se mogu pojaviti bijeli kristali koji ne utječu na kakvoću proizvoda.

Pakiranje:

Bočica, 120 ml ili 250 ml

Preporučena dnevna doza i način uporabe:

	Tjelesna masa (kg)	Preporučena količina (ml)	IMG® (beta-(1,3/1,6)-D-glukan) (mg)	Vitamin C (mg)
Djeca	15	3	30	30 (38 % PU)
	20	4	40	40 (50 % PU)
	25	5	50	50 (63 % PU)
	30	6	60	60 (75 % PU)
Odrasli	70	14	140	140 (175 % PU)

PU (preporučeni unos)

Upozorenje:

Defendyl-Imunoglukan P4H® junior ne smiju koristiti bolesnici sa presađenim organima. Bolesnici koji su na terapiji imunosupresivima mogu uzimati **Defendyl-Imunoglukan P4H® junior** samo nakon savjetovanja s liječnikom. Preporučene dnevne doze ne smiju se prekoračiti. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani.



Proizvođač: Medis d.o.o., Brnčičeva 1, Ljubljana, Slovenija, u suradnji s Pleuran, s.r.o., EU
Odgovoran za RH: Medis Adria d.o.o., Kolarova 7, Zagreb